

vida.

Comenzando bien® - Encuesta inicial

Nombre:	¿Qué tan avanzado está su embarazo en este
N°. identificación de participante de BaM/Cb:	momento? ☐ 1er trimestre (1 a 13 semanas) ☐ 2o trimestre (14 a 27 semanas) ☐ 3er trimestre (más de 28 semanas)
Fecha de actividad:(mm/dd/aaaa)	¿Cuál es la fecha de su parto?
En caso de "otra respuesta", describa:¿Cómo se enteró de Becoming A Mom/Comenzando bien®? (marque todas las opciones que apliquen) Familiar/amigo Centro de salud Hospital Escuela WIC Administrador de casos de KanCare Volante Otra respuesta En caso de "otra respuesta", describa: Este es su primer embarazo? Sí No No En caso negativo: -¿Ha tenido antes un parto prematuro (la edad gestacional del bebé fue menos de 37 semanas)? Sí No En caso afirmativo: ¿fue un embarazo único, es decir, estaba embarazada de un solo bebé? Sí No En caso afirmativo: ¿el parto prematuro fue espontáneo, es decir, entró en trabajo de parto de manera natural? Sí No	¿Ha tenido su primera cita prenatal? Sí No -En caso negativo, ¿ya programó su cita? Sí No -En caso negativo, ¿cuál es el motivo por el que no ha programado su cita? No hay un proveedor disponible El proveedor no empezará su atención hasta más adelante (estoy en las primeras etapas del embarazo) No puedo faltar a la escuela o al trabajo No hay guardería disponible para mis otros hijos No tengo cobertura de seguro médico/no puedo pagarlo No tengo transporte Ctra respuesta En caso de "otra respuesta", describa: ¿En qué trimestre comenzó a acudir con un proveedor de atención médica para este embarazo? 1 er trimestre (1 a 13 semanas) 2 o trimestre (14 a 27 semanas) 3 er trimestre (más de 28 semanas) ¿Cuál es el nombre de su proveedor de atención médica/centro de salud?
¿Ha tenido alguno de los siguientes? Un bebé que pesó menos de 5 libras. Más de un aborto espontáneo. Un bebé que no nació vivo. Un bebé que falleció durante su primer año de 	



☐ Otra respuesta

Comenzando bien® - Encuesta inicial

¿Tenía alguna de las siguientes condiciones de salud antes del embarazo? ☐ Anemia ☐ Ansiedad ☐ Asma	En caso de otra respuesta, ¿qué otra afección de salud ha desarrollado hasta el momento en su embarazo?
☐ Trastorno de coagulación de la sangre ☐ COVID-19 ☐ Depresión ☐ Diabetes (antes del embarazo) ☐ Sobrepeso / IMC Alto ☐ Enfermedad cardíaca ☐ Presión arterial alta ☐ Enfermedad pulmonar/afección respiratoria ☐ Lupus/otra enfermedad autoinmune ☐ Convulsiones ☐ Anemia de células falciformes ☐ Trastorno de consumo de sustancias ☐ (incapacidad para controlar el consumo de ☐ fármacos legales o drogas, medicamentos, ☐ alcohol o nicotina) ☐ Enfermedad de la tiroides	¿Su proveedor de atención médica le informó que tiene un embarazo de "alto riesgo"? SÍ NO En caso afirmativo, indique los motivos: ¿Está inscrita en el Programa WIC? SÍ NO Lo siguiente algunas veces me impide asistir a mis
☐ Otra respuesta ☐ Ninguna En caso de otra respuesta, ¿qué enfermedad tenía antes de su embarazo?	citas prenatales: (marque todas las opciones que apliquen) Nada Guardería Transporte No tengo documentos No tengo proveedor de atención médica Me preocupa el pago Trabajo/escuela
¿Ha desarrollado alguna afección de salud hasta el momento en su embarazo?	☐ Otra respuesta Especifique "otros" obstáculos por los que no puede asistir a las citas prenatales:
En caso afirmativo, indique las afecciones médicas que ha desarrollado: Anemia Ansiedad Colestasis (enfermedad hepática que se presenta a finales del embarazo) COVID-19 Depresión Eclampsia (presión arterial alta que provoca convulsiones) Diabetes gestacional Presión arterial alta Placenta previa Preeclampsia Preeclampsia Parto prematuro (entró en trabajo de parto antes de las 37 semanas de gestación) Convulsiones (que no son provocadas por presión arterial alta) Trastorno o recaída del consumo de sustancias (incapacidad para controlar el consumo de fármacos legales o drogas, medicamentos, alcohol o nicotina)	¿Cuál de las siguientes opciones son signos de un parto prematuro/parto? (marque todas las opciones que apliquen) Un cambio en el flujo vaginal (acuoso, mucoso o con sangre), o más flujo vaginal de lo habitual Aumento de presión vaginal o la sensación de que su bebé está empujando hacia abajo Dolor de espalda constante, bajo y sordo. Calambres abdominales con o sin diarrea Calambres que se sienten como la menstruación Ninguna de las anteriores Debo hacer lo siguiente si estoy teniendo un parto prematuro (antes de las 37 semanas): (marque todas las opciones que apliquen) Llamar a mi proveedor de atención médica Ir al hospital si no puedo comunicarme con mi proveedor No tomar ninguna medida y esperar a ver si mis síntomas desaparecen Ninguna de las anteriores



¿Cuáles de las siguientes son señales de

Comenzando bien® - Encuesta inicial

Si estoy considerando tomar medicamentos

advertencia POSPARTO? (marque todo lo que	(recetados y/o de venta libre, herbolarios, etc.), es
corresponda)	que hable con mi proveedor de atención
☐ Dolor en el pecho	médica antes de tomarlos.
☐ Respiración obstruida o dificultad para respirar	 Muy probable
☐ Convulsiones	Probable
☐ Pensamientos de lastimarme a mí misma o a	 Algo probable
alguien más	 Nada probable
☐ sudoración nocturna sin fiebre	·
☐ Ninguna de las anteriores	Actualmente tomo vitaminas prenatales o
-	multivitamínicos que contienen ácido fólico:
Debo hacer lo siguiente si experimento señales de	 Todos los días
advertencia POSPARTO: (marque todo lo que	 4-6 veces a la semana
corresponda)	 1-3 veces a la semana
☐ Llamar al 911 si tengo señales de advertencia	o Nunca
POSPARTO URGENTES o que ponen en	
peligro mi vida	Camino o hago al menos 30 minutos de actividad
☐ Llamar a mi proveedor de atención médica (o	física moderada y de bajo impacto días a la
acudir a la SALA de URGENCIAS si no puedo	semana.
comunicarme con mi proveedor de atención	o 0
médica) si tengo otras señales de advertencia	o 1-3
POSTPARTO.	o 4-6
☐ Confiar siempre en mis instintos y busco	_
atención médica si no me siento bien o tengo	0 7
dudas.	Actualmenta fumalyanca
☐ Informar al 911 o a mi proveedor de atención	Actualmente fumo/vapeo
médica que estuve embarazada recientemente.	O Managa da 14 agistilla da ginamilla a al día
	o Menos de ½ cajetilla de cigarrillos al día
☐ Ninguna de las anteriores	 ½ cajetilla a una cajetilla completa de cigarrillos
Ci tanna dannación ula anaiadad dunanta a daguusa	al día
Si tengo depresión y/o ansiedad durante o después	 Más de una cajetilla completa de cigarrillos al día
de mi embarazo, tengosobre los recursos	
disponibles en mi comunidad.	Vapeo o uso productos de tabaco que no sean igarrillos en la circuiente contidad (describe al
Mucho conocimiento	cigarrillos en la siguiente cantidad (describa el
o Conocimiento	producto que usa y cuánto usa):
 Un poco de conocimiento 	
 Nada de conocimiento 	For any decomplies we when do newton bable do (1
	Esque desarrolle un plan de parto y hable de él
Si tengo depresión y/o ansiedad durante o después	con mi proveedor de atención médica.
de mi embarazo, esque hable con mi	 Muy probable
proveedor de atención médica y/o acceda a los	o Probable
recursos disponibles:	 Algo probable
 Muy probable 	 Nada probable
 Probable 	
 Algo probable 	Un embarazo es de término completo cuando llega a
 Nada probable 	lassemanas.
	o 34-36
He hablado con mi proveedor de atención médica	o 37-38
sobre los medicamentos que estoy tomando	o 39-40
(recetados y/o de venta libre, herbolarios, etc.):	
° Sí	Los siguientes son los beneficios de un embarazo
o No	de término completo:
N/A; no estoy tomando ningún medicamento	(marque todas las opciones que apliquen)
1 , setty terrained finingarithe and affective	☐ El desarrollo y crecimiento del cerebro del bebé
	☐ El desarrollo y la madurez de los pulmones del

☐ Es menos probable que sea admitido a la unidad de cuidados intensivos neonatales

☐ Mejora la capacidad de amamantar

(NICU)



Comenzando bien® - Encuesta inicial

Lo sigu	uiente es cierto sobre el amamantamiento: todas las opciones que apliquen)
`	Será menos probable que mi bebé tenga
_	diabetes más adelante en su vida
	Disminuirá mi riesgo de padecer algunos tipos
	de cánceres
_	
	El amamantamiento no debe ser doloroso
	La frecuencia con la que amamanto en las
	primeras 48 horas después del parto puede
	afectar mi capacidad de producir suficiente
	leche para mi bebé.
Es	que amamante a mi bebé.
0	Muy probable
0	Probable
0	Algo probable
0	Nada probable
0	No estoy segura
Si esto	y teniendo problemas para amamantar a mi
	si tengo dudas sobre cómo amamantar,
	corecurso(s) disponible(s) en mi
comun	
0	Uno
0	Más de uno
0	No conozco ninguno
	Ç
Me sie	ntode mi capacidad para amamantar.
0	Muy segura
0	Segura
0	Poco segura
0	Nada segura
O	rada segura
Despu	és del parto, planeo tomar vitaminas
	ales o multivitamínicos que contienen ácido
fólico:	and a manifestation and a second and a second
0	Todos los días
_	
0	4-6 veces a la semana
0	1-3 veces a la semana
0	Nunca
Danduá	i a mi habé a dammin aabna a
/margue	é a mi bebé a <u>dormir</u> sobre su:
(marque	todas las opciones que apliquen)
	Espalda
	Costado
	Boca abajo
	a mai babá da masiná.
∟n cas	a, mi bebé <u>dormirá</u> :
· <u>-</u>	todas las opciones que apliquen)
	En una cuna o cuna portátil
	En una cama de adulto, sofá o sillón reclinable
	conmigo
	En un asiento para automóvil, portabebé,
	mecedora o columpio

Es___que hable sobre Safe Sleep (sueño seguro) con los otros proveedores de atención de mi hijo (miembros de la familia, proveedores de cuidados infantiles, etc.).

- o Muy probable
- Probable
- o Algo probable
- Nada probable

Es___que hable con mi proveedor de atención médica durante mi atención prenatal acerca de los métodos para evitar un embarazo después del nacimiento de mi bebé:

- ☐ Muy probable
- □ Probable
- □ Algo probable
- □ Nada probable

Creo que hay para mi salud y la salud de mi siguiente bebé si espero un mínimo de 18 meses antes de volver a embarazarme.

- Un gran beneficio
- o Un poco de beneficio
- Ningún beneficio